

Allegato 12

Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva

Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
131-1	9,1		Fustaia di pino domestico	ind	evoluzione controllata	9,1	annuale	Asportazione dei pini senescenti, pericolosi per manifesti sintomi di instabilità, rimozione dei pini caduti; potatura dei rami pericolanti
131-2	3,4		Fustaia di pino domestico	61	evoluzione controllata	3,4	annuale	Asportazione dei pini senescenti, pericolosi per manifesti sintomi di instabilità, rimozione dei pini caduti; potatura dei rami pericolanti
131-3	0,5		Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,5	annuale	Asportazione dei pini senescenti, pericolosi per manifesti sintomi di instabilità, rimozione dei pini caduti; potatura dei rami pericolanti
567-2	12,3		Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	12,3	annuale	Asportazione di pini, pioppi e frassini senescenti, pericolosi per manifesti sintomi di instabilità, rimozione delle piante cadute; potatura dei rami pericolosi.
567-3	0,6		Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,6	annuale	Asportazione di pini, pioppi e frassini senescenti, pericolosi per manifesti sintomi di instabilità, rimozione delle piante cadute; potatura dei rami pericolosi.
579-2	1,6		Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,6	annuale	Asportazione di pini, pioppi e frassini senescenti, pericolosi per manifesti sintomi di instabilità, rimozione delle piante cadute; potatura dei rami pericolosi.
131-4	14,9		Incolto	-	sistemazione turistica	14,9	annuale	Sfalcio periodico nei mesi primaverili, impianto di alberi singoli e a gruppi, potatura dei rami pericolanti e abbattimento delle piante senescenti.
494-1	0,6		Incolto	-	sistemazione turistica	0,6	annuale	Sfalcio periodico nei mesi primaverili, impianto di alberi singoli e a gruppi, potatura dei rami pericolanti e abbattimento delle piante senescenti.
565-1	1,2		Incolto	-	sistemazione turistica	1,2	annuale	Sfalcio periodico nei mesi primaverili, impianto di alberi singoli e a gruppi, potatura dei rami pericolanti e abbattimento delle piante senescenti.
567-1	26,6		Incolto	-	sistemazione turistica	26,6	annuale	Sfalcio periodico nei mesi primaverili, impianto di alberi singoli e a gruppi, potatura dei rami pericolanti e abbattimento delle piante senescenti.
579-1	23,9		Incolto	-	sistemazione turistica	23,9	annuale	Sfalcio periodico nei mesi primaverili, impianto di alberi singoli e a gruppi, potatura dei rami pericolanti e abbattimento delle piante senescenti.
580-1	9,5		Incolto	-	sistemazione turistica	9,5	annuale	Sfalcio periodico nei mesi primaverili, impianto di alberi singoli e a gruppi, potatura dei rami pericolanti e abbattimento delle piante senescenti.
Compresa altre superfici in evoluzione controllata								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
547-6	25,6	1°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	25,6		Realizzazione di una duna a mare di almeno 7 metri di altezza. Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , <i>Spartina juncea</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
544-5	5,8	1°	Fascia costiera di protezione	ind	rinfoltimento	5,8		Impianto e/o semina, nelle buche presenti, di arbusti sclerofillici
165-6	0,4	2°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	0,4		Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
165-8	3,1	2°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	3,1		Realizzazione di duna e semina di specie autoctone
538-2	37,2	2°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	37,2		Realizzazione di una duna a mare di almeno 7 metri di altezza. Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
528-2	21,9	3°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	21,9		Realizzazione di una duna a mare di almeno 7 metri di altezza. Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
529-2	5,3	3°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	5,3		Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
528-3	11,8	3°	Fascia costiera di protezione	ind	rinfoltimento	11,8		Impianto e/o semina, nelle buche presenti, di pino marittimo, tamerici, e arbusti sclerofillici: ginepro coccolone, lentisco, alaterno, mirto, stracciabrache (<i>Smilax aspera</i>), caprifoglio sempreverde (<i>Lonicera implexa</i>).
529-3	15,0	3°	Fascia costiera di protezione	ind	rinfoltimento	15,0		Impianto e/o semina, nelle buche presenti, di pino marittimo, tamerici, e arbusti sclerofillici: ginepro coccolone, lentisco, alaterno, mirto, stracciabrache (<i>Smilax aspera</i>), caprifoglio sempreverde (<i>Lonicera implexa</i>).
285-3	0,5	4°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	0,5		Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
519-2	27,9	4°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	27,9		Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.

Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
520-2	11,2	4°	Vegetazione dunale	-	Interventi di bioingegneria	11,2		Semina di specie autoctone per il rinsaldamento della duna. Sulla duna: <i>Helicrysum stoechas</i> , <i>Anthemis maritima</i> , <i>Medicago marina</i> , <i>Ammophila arenaria</i> , nel retroduna ginepro coccolone, cisti, lentisco, alaterno, pino marittimo, tamerici.
519-3	25,7	5°	Fascia costiera di protezione	ind	rinfoltimento	25,7		Impianto e/o semina, nelle buche presenti, di pino marittimo, tamerici, e arbusti sclerofillici: ginepro coccolone, lentisco, alaterno, mirto, stracciabrache (<i>Smilax aspera</i>), caprifoglio sempreverde (<i>Lonicera implexa</i>).
520-3	10,8	5°	Fascia costiera di protezione	ind	rinfoltimento	10,8		Impianto e/o semina, nelle buche presenti, di pino marittimo, tamerici, e arbusti sclerofillici: ginepro coccolone, lentisco, alaterno, mirto, stracciabrache (<i>Smilax aspera</i>), caprifoglio sempreverde (<i>Lonicera implexa</i>).
Compresa fustaie di latifoglie in evoluzione controllata								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
042-2	0,8	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,8	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
077-2	0,9	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,9	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente posizionate ai limiti del Femminello, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
101-2	1,3	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,3	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
102-2	2,0	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,0	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
146-2	0,7	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,7	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
147-2	1,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,2	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
148-2	0,6	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,6	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
180-2	3,0	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,0	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
181-2	0,9	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,9	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
184-2	4,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,4	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
185-2	4,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,2	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
186-2	0,7	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,7	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
187-2	2,7	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,7	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
219-2	2,1	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,1	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
220-3	1,0	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,0	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
220-4	4,9	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,9	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
222-3	3,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,5	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
225-2	1,1	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,1	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
239-2	1,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,2	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
243-2	1,4	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,4	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
243-3	1,5	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,5	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
251-2	1,2	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,2	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
260-2	0,7	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,7	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie

Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva

Par. n.	sup. ha	Q	Compresa altre superfici in gestione ordinaria			int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
			tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale			
								morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
262-2	1,7	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,7	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
262-2	1,7	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,7	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
280-2	3,1	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,1	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
281-1	4,9	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,9	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro i 20 metri dal limite con pian degli Ontanelli, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
282-1	5,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,5	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro i 20 metri dal limite con pian degli Ontanelli, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
282-3	0,3	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,3	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro i 20 metri dal limite con pian degli Ontanelli, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
283-1	7,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	7,4	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro i 20 metri dal limite con pian degli Ontanelli, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
297-1	3,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,5	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
298-1	25,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	25,2	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
301-1	3,8	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,8	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente posizionate ai limiti di Pian dei Meli, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
302-1	5,1	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,1	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente posizionate ai limiti di Pian dei Meli, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
303-1	1,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,2	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente posizionate ai limiti del fosso del Femminello, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
304-1	6,3	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	6,3	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
305-3	3,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,2	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco. Mantenere attraverso interventi sperimentali, oggetto di studio successivo, gli spazi paludosi (serie di "lagacci" intradunali), limitando, quando necessario, anche l'ingresso delle specie arboree e arbustive.
306-4	5,9	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,9	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco. Mantenere attraverso interventi sperimentali, oggetto di studio successivo, gli spazi paludosi "lagaccia centrale", limitando, quando necessario, anche l'ingresso delle specie arboree e arbustive.
307-1	5,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,2	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
308-1	8,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	8,4	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
309-1	7,6	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	7,6	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco. Mantenere attraverso interventi sperimentali, oggetto di studio successivo, gli spazi paludosi "lagacci", limitando, quando necessario, anche l'ingresso delle specie arboree e arbustive.
310-2	4,6	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,6	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
311-1	8,1	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	8,1	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo il Fosso dell'Anguillara, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco. Mantenere attraverso interventi sperimentali, oggetto di

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Par. n.	sup. ha	Q	Compresa altre superfici in gestione ordinaria			int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
			tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale			
								studio successivo, gli spazi paludosi "lagacci", limitando, quando necessario, anche l'ingresso delle specie arboree e arbustive.
312-1	2,0	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,0	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 2/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
313-1	2,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,5	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente posizionate entro una fascia di 20 metri lungo il Fosso dell'anguillara, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco. Mantenere attraverso interventi sperimentali, oggetto di studio successivo, gli spazi paludosi "lagacci", limitando, quando necessario, anche l'ingresso delle specie arboree e arbustive.
325-1	15,7	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	15,7	2014	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
328-1	9,9	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	9,9	2007	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
328-2	3,3	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,3	2007	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
333-1	2,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,5	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
334-1	17,7	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	17,7	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
344-1	4,1	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,1	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
345-1	6,0	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	6,0	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
346-1	6,7	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	6,7	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
347-1	2,9	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,9	2013	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
348-1	11,8	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	11,8	2013	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
349-1	17,1	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	17,1	2014	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
350-1	35,1	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	35,1	2012	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
351-1	18,8	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	18,8	2013	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
352-1	14,9	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	14,9	2014	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
353-1	11,4	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	11,4	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
354-1	17,0	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	17,0	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
355-1	11,3	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	11,3	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
355-3	0,3	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,3	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
356-1	13,3	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	13,3	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
357-1	12,2	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	12,2	2016	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
358-1	7,5	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	7,5	2016	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
359-1	18,4	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	18,4	2016	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
360-1	17,4	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	17,4	2016	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
360-3	0,9	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	0,9	2016	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
361-1	1,0	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,0	2007	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
362-1	20,1	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	20,1	2007	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
365-1	1,3	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,3	2007	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
367-1	5,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,4	2007	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
368-1	16,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	16,4	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
375-1	5,8	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,8	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
376-1	16,0	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	16,0	2017	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
377-1	16,1	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	16,1	2017	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
379-1	14,5	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	14,5	2017	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
380-1	9,6	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	9,6	2018	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
381-1	19,9	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	19,9	2018	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
383-1	10,4	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	10,4	2018	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
384-1	5,6	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,6	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
386-1	27,1	3	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	27,1	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto quelle presenti entro una fascia di 20 metri lungo il limite con i coltivi di Taglio d'Arnaccio, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
387-1	11,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	11,5	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
388-1	4,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,2	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
389-1	4,5	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,5	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
390-1	5,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	5,4	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
391-1	3,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,2	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente poste entro una fascia di 20 metri lungo i prati delle Cascine, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
392-1	3,2	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	3,2	2008	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
393-1	4,8	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,8	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
394-1	6,3	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	6,3	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
396-1	13,5	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	13,5	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
398-1	1,9	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,9	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
399-2	1,3	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,3	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
500-1	1,4	1	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	1,4	2006	Asportazione dei pini limitanti lo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini senescenti e delle farnie morte. Rilascio di 3/ha farnie sia morte in piedi, preferibilmente posizionate ai limiti del fosso del Femminello, che sul letto di caduta, altrimenti rimozione delle piante morte e cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco.
504-1	4,7	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	4,7	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
574-1	2,5	2	Bosco meso-igrofilo di latifoglie	ind	evoluzione controllata	2,5	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe, dei pioppi e frassini deperienti, rimozione di farnie morte, eccetto 1/ha, e delle piante cadute. Nelle chiarie parziale rinfoltimento con farnia e carpino bianco
575-1	33,3	2	Giovane impianto	20	cure colturali	33,3	2011	Cure colturali consistenti nel taglio dei soggetti più scadenti
Compresa fustate miste in evoluzione controllata								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
021-1	5,1	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	5,1	2005	Asportazione pini caduti per contenere la polluzione di coleotteri corticicoli
022-1	0,8	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,8	2005	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
031-2	2,6	1	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,6	2005	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
032-1	0,5	1	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2005	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
036-1	3,3	1	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,3	2005	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
038-1	2,6	1	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,6	2005	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
044-1	0,8	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,8	2005	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
051-2	3,5	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,5	2005	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
053-1	5,8	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	5,8	2006	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
062-2	0,6	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2006	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
089-2	3,8	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,8	2006	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
090-1	0,6	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2006	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
090-2	2,5	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,5	2006	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
102-1	8,9	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	8,9	2006	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
106-1	2,7	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,7	2007	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
106-3	0,6	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
122-1	3,6	1	Bosco di leccio con pino	ind	evoluzione controllata	3,6	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Par. n.	sup. ha	Q	Compresa altre superfici in gestione ordinaria				int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
			tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale				
			domestico						
126-1	3,9	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	3,9	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
126-2	2,1	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,1	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
126-3	2,0	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,0	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
135-2	0,5	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
179-1	1,6	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,6	2007	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.	
185-3	1,9	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,9	2007	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
225-1	5,8	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	5,8	2007	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.	
230-2	0,6	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2008	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
241-1	3,2	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,2	2008	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.	
259-1	7,7	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	7,7	2008	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
260-1	6,5	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	6,5	2008	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
262-1	5,8	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	5,8	2008	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
279-1	3,2	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,2	2009	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.	
280-1	6,7	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	6,7	2009	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
287-2	1,5	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,5	2009	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
293-1	1,9	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,9	2009	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
294-1	4,6	1	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	4,6	2009	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
301-2	1,3	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,3	2009	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
302-2	2,1	1	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,1	2009	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
305-1	8,8	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	8,8	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
305-2	1,4	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,4	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
306-1	1,9	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,9	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
306-3	1,4	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,4	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
308-2	3,4	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	3,4	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli	
308-4	1,8	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,8	2010	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale	

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
								rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
309-3	2,0	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,0	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
310-3	0,9	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,9	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
312-2	2,0	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,0	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
317-2	2,4	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,4	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
321-2	0,5	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
322-2	0,9	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,9	2010	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
324-2	1,0	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,0	2011	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
335-1	1,5	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,5	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
344-2	1,0	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,0	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
346-2	0,2	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,2	2011	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
347-2	1,3	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,3	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
348-2	1,3	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,3	2011	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
350-2	4,4	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	4,4	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
356-2	1,2	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,2	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
361-2	0,5	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
365-2	1,3	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,3	2011	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
368-2	0,8	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,8	2011	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
372-1	3,5	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,5	2011	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
401-3	2,3	2	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	2,3	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
418-2	0,5	2	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
448-1	3,9	2	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	3,9	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
449-3	1,1	2	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	1,1	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
455-1	0,8	2	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	0,8	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
458-1	1,9	2	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,9	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
502-2	1,1	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,1	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
536-1	0,7	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,7	2012	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
549-2	1,1	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,1	2012	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
576-1	1,3	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,3	2012	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
021-1	5,1	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	5,1	2013	Asportazione pini caduti per contenere la polluzione di coleotteri corticicoli
022-1	0,8	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,8	2013	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
031-2	2,6	2	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,6	2013	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
032-1	0,5	2	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2013	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
036-1	3,3	2	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,3	2013	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
038-1	2,6	2	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,6	2013	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
044-1	0,8	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,8	2013	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
051-2	3,5	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,5	2013	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
053-1	5,8	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	5,8	2014	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
062-2	0,6	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2014	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
089-2	3,8	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,8	2014	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
090-1	0,6	2	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2014	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
090-2	2,5	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,5	2014	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
102-1	8,9	2	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	8,9	2014	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
106-1	2,7	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,7	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
106-3	0,6	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
122-1	3,6	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	3,6	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
126-1	3,9	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	3,9	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
126-2	2,1	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,1	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
126-3	2,0	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,0	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
135-2	0,5	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
179-1	1,6	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,6	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
185-3	1,9	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,9	2015	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
225-1	5,8	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	5,8	2015	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
230-2	0,6	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,6	2016	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
241-1	3,2	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,2	2016	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
259-1	7,7	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	7,7	2016	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
260-1	6,5	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	6,5	2016	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
262-1	5,8	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	5,8	2016	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
279-1	3,2	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,2	2017	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
280-1	6,7	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	6,7	2017	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
287-2	1,5	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,5	2017	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
293-1	1,9	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,9	2017	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
294-1	4,6	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	4,6	2017	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
301-2	1,3	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,3	2017	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
302-2	2,1	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,1	2017	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
305-1	8,8	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	8,8	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
305-2	1,4	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,4	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
306-1	1,9	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,9	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
306-3	1,4	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,4	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
308-2	3,4	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	3,4	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
308-4	1,8	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,8	2018	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
309-3	2,0	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,0	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
310-3	0,9	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,9	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
312-2	2,0	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	2,0	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
317-2	2,4	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	2,4	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
321-2	0,5	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
322-2	0,9	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,9	2018	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
324-2	1,0	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,0	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
335-1	1,5	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,5	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.

*Allegato 12 del programma quindicennale degli interventi forestali della Tenuta di San Rossore
Descrizione integrale per particella degli interventi proposti nelle altre comprese a selvicoltura attiva*

Compresa altre superfici in gestione ordinaria								
Par. n.	sup. ha	Q	tipo fisionomico	età anni	Intervento attuale	int. ha	inter. anno	Descrizione dell'intervento
344-2	1,0	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,0	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
346-2	0,2	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,2	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
347-2	1,3	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,3	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
348-2	1,3	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,3	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
350-2	4,4	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	4,4	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
356-2	1,2	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,2	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
361-2	0,5	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
365-2	1,3	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,3	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
368-2	0,8	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,8	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
372-1	3,5	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	3,5	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
401-3	2,3	3	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	2,3	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
418-2	0,5	3	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	0,5	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
449-3	1,1	3	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	1,1	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
455-1	0,8	3	Bosco a prevalenza di leccio con pini	ind	evoluzione controllata	0,8	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
458-1	1,9	3	Bosco igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,9	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
502-2	1,1	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	1,1	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
536-1	0,7	3	Bosco di leccio con pino domestico	ind	evoluzione controllata	0,7	2019	Asportazione pini caduti per contenere la diffusione degli insetti corticicoli
549-2	1,1	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,1	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.
576-1	1,3	3	Bosco meso-igrofilo con pini	ind	evoluzione controllata	1,3	2019	Asportazione dei pini deperienti o di ostacolo allo sviluppo delle latifoglie sottoposte o limitrofe rimozione dei pini caduti. Nelle chiarie parziale rinfoltimento, nelle depressioni, con farnia e carpino bianco e, nelle aree più elevate, con leccio.